

のどの殺菌・消毒、口臭除去に ポビドンうがい薬

「ポビドンうがい薬」は、有効成分のポビドンヨードが、のどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

すぐれた防臭効果によって口臭を除去し、口の中を清浄にします。

スッキリ味で、ご使用後、清涼感が得られます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に
相談してください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
口内のひどいただれ。
- (4) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害。



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を
持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量


1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいしてください。
専用のコップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。
コップを水平にもどし、上部の水平の線まで
水を入れると、約60mLになります。

フタを「カチッ」と音がするまで開くとフタがロックされます。



上の目盛りまでが4mL

下の目盛りまでが2mL



用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) うがい用にのみ使用してください。
- (3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早目に使用してください。

成分及び分量

1mL中

ポビドンヨード……………70mg（有効ヨウ素7mg）

添加物 サッカリンナトリウム水和物、*l*-メントール、ユーカリ油、無水エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

成分及び分量に関連する注意

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 衣類に付着したときは、水で洗い流してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。（使用期限はボトル底面に記載）



玉川衛材(株) お客様相談窓口

TEL 03-3861-2037

受付時間: 平日9:00-17:00 (土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度

TEL 0120-149-931

製造販売元

 **タマガワ**
玉川衛材株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-16



ホームページ

<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>