

色のつかないスプレータイプ  
殺菌消毒薬 **マツキンZ** 特納用

## 使用上の注意



## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどいやけどの人

## 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状が皮ふにあらわれた場合 発疹・発赤、かゆみ、はれ
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

## 効能・効果

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒。痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒。

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆ってください。

## &lt;用法・用量に関する注意&gt;

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

## 成分

本品 40mL中 ベンザルコニウム塩化物40mg、塩酸リドカイン400mg、ナファゾリン塩酸塩40mg、  
クロルフェニラミンマレイン酸塩80mg 添加物:香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。(使用期限は箱裏面・ボトル底面に記載)

玉川衛材(株)お客様相談窓口  
TEL 03-3861-2037  
受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度  
TEL 0120-149-931

製造販売元

 **タマガワ**  
玉川衛材株式会社  
東京都千代田区岩本町2-2-16



ホームページ  
<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>