

タマガワヨードホルムガーゼは消毒性包帯材料として用いる外皮用殺菌消毒剤です。

**感染のある創傷、壊死組織が残存した感染の恐れのある深い潰瘍に適しています。**

監修：国立長寿医療研究センター

高齢者薬物治療研究室長

古田 勝経 先生

## 《感染のある創傷・壊死組織が残存した深い潰瘍への使い方》

### 1 洗 浄



創内の異物、残渣を生理食塩液などで洗浄します。

※詰め込みすぎないように、ふんわりとおいてください。



### 2 創面におく



創の大きさに合わせ適切なサイズ(目安:創傷・潰瘍の底面積の2倍程度)にカットし、軽く折りたたんで創面におきます。滲出液が少ない場合は、少量の生理食塩液で湿らせます。

### 3 被 覆



深い創の場合は、死腔をつくらないようにヨードホルムガーゼの上にガーゼ、又はさばきガーゼを軽くのせます。必要に応じてフィルム材で被覆します。

### 4 交 換



創の状態を診て、1日1~2回交換します。壊死組織がなくなり、創が清浄化して、きれいな肉芽が出てきたらヨードホルムガーゼの使用を終了します。

## お取り扱い上のポイント

- あらかじめ消毒済みのはさみとピンセットをご用意ください。ピンセットは長めが2本あると便利です。
- ガーゼは丸まった状態で入っています。1本のピンセットでガーゼの端をつまみ上げ、もう1本のピンセットで丸まった部分を解きながら少しずつ引き出して、必要な大きさにカットしてお使いください。
- 使用後は速やかに内蓋と外蓋をしっかりと閉め、アルミジップ袋に入れた状態で室温保管してください。

**タマガワ**  
ヨードホルムガーゼ 5m  
30cm×5m

**タマガワ**  
ヨードホルムガーゼ 裁断  
30cm×30cm・15枚入



## ■Drug Information

外皮用殺菌消毒剤

# タマガワヨードホルムガーゼ

日本標準商品分類番号 872612

(薬価基準未収載)

\*2005年4月改訂

### 【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- (1)ヨード過敏症の患者
- (2)腎障害のある患者[本剤の主たる排泄臓器は腎臓であり、腎機能低下患者では血中総ヨウ素濃度が著しく上昇することがある。]
- (3)心障害のある患者

### 【組成・性状】

#### 1. 組成

有効成分

日局 ヨードホルム 1.1g/0.3m<sup>2</sup>(30cm×1m)

本品は添加物として流動パラフィン含有する。

#### 2. 製剤の性状

本品は淡黄色のガーゼでヨードホルムのおいがある。

【効能・効果】 創傷、潰瘍の殺菌・消毒

【用法・用量】 消毒性包帯材料として用いる。

### 【使用上の注意】

#### 1. 慎重投与(次の患者には慎重に使用すること)

甲状腺機能に異常のある患者[甲状腺機能に異常がある場合はヨードホルムの使用により血中ヨウ素値の調節ができず、甲状腺ホルモン関連物質に影響を与える可能性がある。]

#### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

#### (1)重大な副作用(頻度不明)

ヨード中毒

以下のような症状のヨード中毒を起こすことがあるので、血中総ヨウ素濃度の測定を行うなど、十分な観察を行い、異常が認められた場合には使用を中止し、十分洗浄して適切な処置を行うこと。

- 1) 中枢神経系:興奮、せん妄、不穏、見当識障害、記憶障害、抑うつ、昏睡、失神、傾眠、不眠(睡眠障害)等
- 2) 消化器:食欲不振等
- 3) その他:頭痛、全身倦怠感、頻脈等

#### (2)その他の副作用

種類	副作用発現頻度 0.1%未満
過敏症	掻痒感、ヨード疹、蕁麻疹様発疹、紅斑、丘疹、水疱等
皮膚	灼熱感等

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止し適切な処置を行うこと。

### 3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

授乳婦に使用する場合は授乳を避けさせること。[ヒト母乳中へ移行し、新生児に一過性の甲状腺機能低下を起こしたとの報告がある。]

### 4. 臨床検査値への影響

血漿たん白結合ヨード(PBI)及び甲状腺放射性ヨード摂取率の検査値に影響を及ぼすことがある。

### 5. 過量投与

ヨードホルム原末を1回4g局所に塗布した例で、ヨード中毒及び心筋の変性による心臓衰弱のため死亡したとの報告がある。

### 6. 適用上の注意

#### (1)投与経路

- 1) 外用にのみ使用すること。

#### (2)使用時

- 1) 目に接触しないように注意すること。  
接触した場合には、水で良く洗い流すこと。
- 2) 長期間又は広範囲に使用しないこと。
- 3) ヨードホルムの結晶が析出している場合は、使用しないこと。
- 4) 石けん類は、本品の殺菌作用を弱めるので、石けん成分を洗い落としてから使用すること。

### 7. その他の注意

本剤はヨウ素含有製剤であるので、多量投与及び長期連用時には甲状腺機能の変動に注意すること。

### 【取り扱い上の注意】

1. 取り扱いの際はなるべく消毒済みのはさみ及びピンセットを用いること。
2. 使用後は速やかに蓋をして密栓の上、遮光し高温を避けて保存すること。
3. 開封後は速やかに使用すること。

【包装】 30cm×5m, (30cm×30cm)15枚

※詳細は添付文書をご参照ください。

【製造販売元】

**タマガワ**  
玉川衛材株式会社  
東京都千代田区岩本町2-2-16

【お客様相談窓口】

TEL 03-3861-2037

受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>