

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

化膿を防ぐウェットタイプの殺菌消毒パット



切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等は日常よく見られますが、細菌からの感染を守るために、できるだけ早く殺菌消毒薬で手当てすることが必要です。 「リバガーゼF」は殺菌消毒液を特殊ガーゼに含ませ、これを1枚ずつアルミ袋で包装したハンディタイプの殺菌消毒ガーゼです。 アクリノールは殺菌作用が強く、しかも血清たん白の存在下でも作用が減弱しません。 有孔ポリエチルフィルム付きガーゼを使用しているので、傷口にガーゼが付着しにくく交換も容易で、はがすとき痛くありません。

△使用上の注意

1. 次の人は使用しないで下さい。
(1)患部が広範囲の人 (2)深い傷やひどいやけどの人
2. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
3. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

[効能又は効果]

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

[用法及び用量]

アルミ袋を開封し、中のガーゼをピンセットで取り出し、つやのある面を傷口にあて、添付の固定用粘着シートで被覆固定して下さい。
又、創傷面を消毒する際にはガーゼ面(つやのない面)で清拭して下さい。

創傷面が特に小さい場合には適宜折りたたむか、又は裁断の上使用して下さい。

用法及び用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用して下さい。
- (3) 固定用シートの粘着面を直接患部に貼らないで下さい。
- (4) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。
- (6) 固定用粘着シートの貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には粘着シートの使用を中止し、包帯等他の方法で固定して下さい。
- (7) ガーゼについている透明なフィルムは、はがさずにそのまま使用して下さい。
- (8) 粘着テープに薬液が染み出しますので、そのような場合は上から包帯を巻くなど、衣服を汚さないように注意して下さい。

[成分及び分量]

本品1包(1.8g)中
アクリノール水和物0.2%液 ······ 1.5g
基 布(4×5cm) ······ 0.3g
添加物 濃グリセリン

通気性の良い固定用粘着シートを使用しているため、薬液がしみだしてくるおそれがありますので、じかに衣類等が触れないようご注意下さい。万一、薬液が付着した場合は、すぐに付着した生地の下にガーゼ又はタオル等をあて、酢を浸した脱脂綿等で付着部分を上から繰り返したいて下さい。その後、酸素系漂白剤の使用できる衣類等については、液体の酸素系漂白剤を付着した部分に塗布して漂白して下さい。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL 03-3861-2037
受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)



ホームページ
<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>

製造販売元

 **タマガワ**
玉川衛材株式会社
東京都千代田区岩本町2-2-16